Facoltà di Architettura
Scienze dell'Architettura

Meccanica delle Strutture

Paolo Casini

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Università di Roma *La Sapienza*

E-mail: p.casini@uniroma1.it
pagina web: www.pcasini.it/disg/statica

Testo di riferimento:
Paolo Casini, Marcello Vasta. *Scienza delle Costruzioni*,
CittàStudi DeAgostini, 4° Edizione, 2019

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Lezione 2

Parte 0 – Concetti di base

- Richiami di fisica
- Teoria dei vettori

Paolo Casini, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. www.pcasini.it

1. Richiami di fisica

- **Generalità: fisica e fenomeni fisici**
- **Meccanica classica**
- **Grandezze fisiche**
- **Misura e unità di misura**
- **Grandezze fisiche fondamentali e derivate**
- **Equazioni dimensionali**

1. Richiami: Generalità

FISICA: si occupa di descrivere qualitativamente e quantitativamente i fenomeni naturali

DISCIPLINE: la fisica è suddivisa in diverse discipline, fra cui ad esempio: meccanica classica e relativistica, termodinamica, elettromagnetismo

Meccanica classica

Meccanica relativistica



1. Richiami: Generalità

FISICA: si occupa di descrivere qualitativamente e quantitativamente i fenomeni naturali

DISCIPLINE: la fisica è suddivisa in diverse discipline, fra cui ad esempio: meccanica classica e relativistica, termodinamica, elettromagnetismo

Termodinamica



Elettromagnetismo

1. Richiami: Meccanica

MECCANICA: studia, qualitativamente e quantitativamente, il moto dei corpi (spostamenti, velocità, accelerazioni), le cause che provocano il moto, le condizioni di equilibrio. Si suddivide tradizionalmente in:

CINEMATICA: studia, qualitativamente e quantitativamente, il moto dei corpi indipendentemente dalle cause che lo provocano. Definisce le grandezze e gli strumenti atti a ***descrivere e misurare***: cambiamenti di posizione e di forma (deformazioni), campi di velocità e di accelerazione

DINAMICA: studia, qualitativamente e quantitativamente, le cause che provocano il moto o le deformazioni dei corpi (*Forze*)

STATICA: studia, qualitativamente e quantitativamente, l'*equilibrio* dei corpi e le condizioni per cui tale *equilibrio si verifica*

Una configurazione C si dice di *equilibrio* per un sistema se, ponendo il sistema in C con atto di moto nullo, il sistema vi permane in *quiete*

1. Richiami: Grandezze fisiche

Grandezze fisiche: le grandezze che entrano in gioco nella descrizione di un dato fenomeno fisico

Grandezze meccaniche: le grandezze fisiche che entrano in gioco nei fenomeni di cui si occupa la meccanica classica: grandezze cinematiche, dinamiche e statiche

Esempio: il pendolo semplice



Grandezze meccaniche

- Lunghezza
- Angolo
- Massa
- Spostamento, velocità, accel.
- tempo
- forza di gravità
- forze dissipative, attriti

1. Richiami: Misure fisiche

Per studiare il fenomeno fisico è necessario '*quantificare*' le grandezze che vi intervengono: questa operazione è chiamata **misura**

Misura: assegnare ad una grandezza fisica un *numero reale* ed una *unità di misura*

Esempio: Misura della lunghezza del pendolo



- Si sceglie arbitrariamente un segmento *campione* a cui si attribuisce convenzionalmente il *valore unitario*
- La misura di $\overline{AB}$ è data dal numero di volte in cui il campione è contenuto in AB
- Il campione è detto **unità di misura** ed è fissato da convenzioni internazionali.

1. Richiami: Dimensioni fisiche

Il tipo di unità di misura definisce la **dimensione fisica** della grandezza: tutte le grandezze che si misurano con la stessa unità di misura hanno le stesse dimensioni fisiche e si dicono *omogenee*.

Simbolo: convenzionalmente la dimensione fisica di una grandezza si rappresenta con lettere racchiuse da parentesi quadre: per esempio $[\boldsymbol{L}]$ rappresenta una grandezza che ha dimensioni fisiche di una lunghezza.

1. Richiami: Grandezze adimensionali

Grandezze adimensionali: per misurarle è sufficiente un numero reale (e non l'unità di misura). Simbolo: **[0]**

Esempio 1: Variazioni percentuali



$$\frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0} \qquad \%$$

Esempio 2: Angolo, radianti



1. Richiami: Grandezze fondamentali e derivate

Non è necessario definire un unità di misura per ogni grandezza fisica: è possibile sceglierne alcune come **fondamentali** e definire tutte le altre (**derivate**) a partire da quelle fondamentali

Esempio: Lunghezza, Area, Volume



$[L]$ $[A]$ $[V]$

1. Richiami: Grandezze fondamentali e derivate

Non è necessario definire un unità di misura per ogni grandezza fisica: è possibile sceglierne alcune come **fondamentali** e definire tutte le altre (**derivate**) a partire da quelle fondamentali

Esempio: Lunghezza grandezza fondamentale, Area e Volume derivate



$[L]$



$A = ab$

$[A] = [L^2]$



$V = abc$

$[V] = [L^3]$

1. Richiami: Sistemi di unità

La scelta delle grandezze fondamentali e delle rispettive unità di misura è stabilita da convenzioni internazionali

Sistema Internazionale, S.I.:

- Lunghezza $[L]$, unità: metro
- Tempo $[t]$, unità secondo
- Massa $[m]$, unità: kg-massa
- Temperatura $[T]$, unità: grado Kelvin

Sistema Pratico:

- Lunghezza $[L]$, unità: metro
- Tempo $[t]$, unità secondo
- Massa $[m]$, unità: kg-massa
- Temperatura $[T]$, unità: grado Kelvin
- Forza $[F]$, unità: Newton

1. Richiami: Equazioni dimensionali

Esercizio 1. Determinare le dimensioni fisiche della grandezza X definita dalla seguente formula:

$$X = \frac{ql^2}{3}$$

Dove $q = 1\ \mathrm{kN/m}$, $l = 2\ \mathrm{m}$,

$[F/L]$ $[L]$

$$[X] = \frac{\left[\frac{F}{L}\right][L^2]}{[0]} = \left[\frac{F}{L}\right][L^2] = [FL]$$

1. Richiami: Equazioni dimensionali

Esercizio 1. Determinare le dimensioni fisiche della grandezza X definita dalla seguente formula:

$$X = \frac{qa^3}{8EI}$$

Dove $q = 1\ \mathrm{kN/m}$, $a = 2\ \mathrm{m}$, $E = 1\ \mathrm{kN/m^2}$, $I = 1\ \mathrm{m^4}$

$[F/L]$ $[L]$ $[F/L^2]$ $[L^4]$

$$[X] = \frac{\left[\frac{F}{L}\right][L^3]}{\left[\frac{F}{L^2}\right][L^4]} = \frac{[FL^2]}{[FL^2]} = [0]$$

1. Richiami: Grandezze fisiche scalari e vettoriali

Grandezze fisiche scalari. Per caratterizzarle è sufficiente un numero reale e un'unità di misura

Esempi: tempo, massa, temperatura, lunghezza, area, volume etc.

Grandezze fisiche Vettoriali. Per caratterizzarle non è sufficiente solo un numero reale e un'unità di misura ma anche una direzione, un verso e, in alcuni casi, un punto di applicazione

Esempi: spostamento, velocità, accelerazione, forza etc.



2. Teoria dei vettori (richiami)

- **Definizioni**
- **Componenti scalari**
- **Operazioni elementari**
- **Prodotto scalare**
- **Prodotto vettoriale**

2. Teoria dei vettori: definizioni

Vettore libero. Si definisce vettore libero o semplicemente *vettore* un ente geometrico caratterizzato da tre elementi: direzione, verso e modulo (o intensità)

$\vec{\mathbf{v}}$ $\mathbf{v}$



Segmento orientato. Un vettore libero si rappresenta con un segmento orientato (ce ne sono ∞^3 equipollenti)



Modulo

$\overline{AB}$ $|\mathbf{v}|$ $|\vec{\mathbf{v}}|$ v

2. Teoria dei vettori: definizioni

Vettore applicato.

$(P, \mathbf{v})$



s: retta d'azione

P: punto di applicazione

Versore $\vec{\mathbf{e}}$. Vettore di modulo unitario

$$|\vec{\mathbf{e}}| = 1$$

Vettore nullo $\vec{\mathbf{0}}$. Vettore di modulo nullo

$$\left|\vec{\mathbf{0}}\right| = 0$$

2. Teoria dei vettori: definizioni

Vettori perpendicolari (normali)

$\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$



Vettori paralleli.

$\mathbf{u} \,//\, \mathbf{v}$



Concordi



Discordi



Uguali e opposti

2. Teoria dei vettori: definizioni

Angolo convesso

$$0 \leq \alpha \leq \pi$$



Concavo



Convesso

Angolo convesso acuto e ottuso



$$0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

acuto



$$\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$$

ottuso

2. Teoria dei vettori: componenti cartesiane

Retta orientata



Versore $\vec{a}$

Versori cartesiani



2. Teoria dei vettori: componenti cartesiane

Componenti cartesiane



2. Teoria dei vettori: componenti cartesiane

Componenti cartesiane (piano)



2. Teoria dei vettori: componenti cartesiane

Componenti cartesiane (piano)



$$v_x = x_B - x_A$$

2. Teoria dei vettori: componenti cartesiane

Componenti cartesiane (piano)



$$v_x = x_B - x_A$$
$$v_y = y_B - y_A$$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$\mathbf{v} \equiv (v_x, v_y)$$

2. Teoria dei vettori: componenti cartesiane

Componenti cartesiane (spazio)



$$v_x = x_B - x_A$$
$$v_y = y_B - y_A$$
$$v_z = z_B - z_A$$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v} \equiv (v_x, v_y, v_z)$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

2. Teoria dei vettori: componenti cartesiane

Sistema di vettori piani



2. Teoria dei vettori: operazioni elementari

Prodotto fra vettore v e numero reale $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda \mathbf{v} = \mathbf{w}$$

direzione: stessa di $\mathbf{v}$

verso: concorde a $\mathbf{v}$ se $\lambda \geq 0$

discorde a $\mathbf{v}$ se $\lambda \leq 0$

modulo: $|\mathbf{w}| = |\lambda|\,|\mathbf{v}|$

Se $\lambda = 0$

$\mathbf{w} = \mathbf{0}$

(vettore nullo)

Se $\lambda = -1$

$\mathbf{w} = -\mathbf{v}$

(vettori uguali e opposti)

Componenti scalari:

$$\mathbf{w} \equiv (w_x, w_y) = (\lambda v_x, \lambda v_y)$$

2. Teoria dei vettori: operazioni elementari

Somma fra vettori

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{w}$$



Direzione, verso, modulo: regola del paralelogramma



Proprietà

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$\lambda(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}$$

Componenti scalari:

$$\mathbf{w} \equiv (w_x, w_y) = (u_x + v_x, u_y + v_y)$$

2. Teoria dei vettori: operazioni elementari

Differenza fra vettori

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v})$$



Direzione e verso: regola del paralelogramma



Componenti scalari:

$$\mathbf{w} \equiv (w_x, w_y) = (u_x - v_x, u_y - v_y)$$

2. Teoria dei vettori: componenti cartesiane

Componenti cartesiane (piano)



$$v_x = x_B - x_A$$
$$v_y = y_B - y_A$$



$$\mathbf{v} \equiv v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j}$$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$\mathbf{v} \equiv (v_x, v_y)$$

2. Teoria dei vettori: operazioni elementari

Combinazione lineare di *N* vettori

$\mathbf{v}_i, \qquad i = 1, \dots, N \qquad\qquad \lambda_i \in \mathbb{R}, \qquad i = 1, \dots, N$

$$\mathbf{w} = \lambda_1 \mathbf{v_1} + \lambda_2 \mathbf{v_2} + \cdots + \lambda_N \mathbf{v_N} = \sum_{i=1}^{N} \lambda_i \mathbf{v_i}$$

Vettori linearmente indipendenti

$\mathbf{v}_i, \qquad i = 1, \dots, N$

Vettori linearmente indipendenti
la loro combinazione lineare si annulla se e solo se:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_N = 0$$

2. Teoria dei vettori: prodotto scalare

Prodotto scalare di due vettori

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} \;= |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos(\alpha) = u\,v\cos(\alpha) = \mathbf{v}\cdot\mathbf{u}$$



$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} > 0$



$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} < 0$



$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0 \;\Leftrightarrow\; \mathbf{u}\perp\mathbf{v}$

Se i vettori sono paralleli e concordi: $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = +uv$

Se i vettori sono paralleli e discordi: $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = -uv$

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2 = u^2$$

2. Teoria dei vettori: prodotto scalare

Prodotto scalare dei versori cartesiani

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=1,\quad \mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=1,\quad \mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=1$$
$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=0,\quad \mathbf{i}\cdot\mathbf{k}=0,\quad \mathbf{j}\cdot\mathbf{k}=0$$



Componenti scalari (caso piano):

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\left(u_x\mathbf{i}+u_y\mathbf{j}\right)\left(v_x\mathbf{i}+v_y\mathbf{j}\right)=u_x\,v_x+u_y\,v_y$$

$$\mathbf{u}\perp\mathbf{v}\ \Rightarrow\ \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0\Rightarrow\quad u_x\,v_x+u_y\,v_y=0$$

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=|\mathbf{u}|^2\Rightarrow\quad |\mathbf{u}|=\sqrt{u_x^2+u_y^2}$$

2. Teoria dei vettori: prodotto vettoriale

Prodotto vettoriale

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{w}$$

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{w}$$

direzione: *perpendicolare al piano* $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$

verso: *regola della mano destra*

modulo: $|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin(\alpha)$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{u} \,//\, \mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$$





2. Teoria dei vettori: prodotto vettoriale

Prodotto vettoriale, componenti scalari

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{w}$$

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{w}$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathrm{Det}\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{bmatrix} = (u_y v_z - u_z v_y)\mathbf{i} + (u_z v_x - u_x z)\mathbf{j} + (u_x v_y - u_y v_x)\mathbf{k}$$

Componenti scalari (u e v nel piano *xy*)

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathrm{Det}\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_x & u_y & 0 \\ v_x & v_y & 0 \end{bmatrix} = (u_x v_y - u_y v_x)\mathbf{k}$$